

AGAPORNIS ROSEICOLLIS - matrice degli accoppiamenti consigliati con riferimento al FENOTIPO PIUMA LUNGA

tipo	mutazione	VERDE	fattore scuro	fattore violetto	cannella	ino	isabella	pallido	ala grigia	pezzato dominante	pezzato recessivo	diluito	fulvo pallido	fulvo bronzo	avorio	avorio faccia bianca	blu**	faccia pallida	faccia arancio	opalino		
	VERDE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
struttura	fattore scuro	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	fattore violetto	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
melanine	cannella	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	ino	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	isabella	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	pallido	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	ala grigia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	pezzato dominante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	pezzato recessivo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	diluito	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	fulvo pallido	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	fulvo bronzo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	psittacofulvine	avorio	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
avorio faccia bianca		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
blu**		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
faccia pallida		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
faccia arancio		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
mel-psi	opalino	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	



nessun incrocio ha controindicazioni di carattere genetico - valutazioni fatte sulla base di considerazioni a soli fini selettivi
incrocio sempre compatibile e consigliato



incrocio compatibile e consigliato con la sola accortezza di ricorrere al portatore ogni 2 o 3 generazioni



incrocio effettuabile ma con attenzione, valutandone caso per caso la convenienza e la fattibilità



incrocio in genere sconsigliato, in casi eccezionali può essere perseguito con stretto controllo del genotipo



incrocio sempre fortemente sconsigliato