# *Agapornis Roseicollis*
# MUTAZIONI AUTOSOMICHE DOMINANTI

**riconosciute FOI** **non riconosciute FOI**

pezzato dominante

sono mutazioni causate dalla forma allelica dominante di un gene mutato il cui *locus* è sito su un autosoma (cromosoma non sessuale)
queste mutazioni si manifestano anche se presenti in singolo fattore, SF o eterozigote, **i soggetti a doppio fattore**, DF o omozigote, **non sono distinguibili da quelli a singolo fattore**

**i risultati sono totalmente indipendenti dal sesso dei riproduttori**, ad esempio accoppiare
**maschio** pezzato x **femmina** verde è lo stesso di **maschio** verde x **femmina** pezzata

la tabella seguente mostra i risultati previsti per le varie combinazioni di accoppiamento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pezzato DF | X | verde | = | 100% pezzato SF | | |
| pezzato SF | X | pezzato SF | = | 50% pezzato SF | 25% pezzato DF | 25% verde |
| pezzato SF | X | verde | = | 50% pezzato SF | 50% verde | |
| pezzato DF | X | pezzato SF | = | 50% pezzato DF | 50% pezzato SF | |
| pezzato DF | X | pezzato DF | = | 100% pezzato DF | | |

**DF = doppio fattore** **SF = singolo fattore**

**pezz dom av cobalto f bianca viola**

**pezzato dominante verde**

**pezzato dom avorio cobalto**

il tipo base assume la seguente denominazione:
pezzato dominante verde o semplicemente pezzato verde

naturalmente la mutazione PEZZATO DOMINANTE può essere introdotta su qualsiasi altra mutazione, benché i migliori risultati si ottengano con: VERDI – VERDI FACCIA ARANCIO – AVORIO – AVORIO FACCIA BIANCA – *BLU* (incluso fattori SCURO e VIOLETTO)